

Gießener Vorsorgeschema I (1.-60. min. p.n.)

1. Lage und Situation unmittelbar nach der Geburt (1- 2 min.)

- Kopf-Brustlage + regelmäßige Atmung 3
(Mundspalt geschlossen)
- Seitenlage + regelmäßige Atmung 2
- Seitenlage + gestörte Atmung 1
(Mundatmung, unregelmäßige Frequenz)

2. Lage und Situation bis zu 30 Minuten nach der Geburt

- Erste Aufstehversuche 3
- Verharren in Brust- oder Seitenlage 2
- Verharren in Brust- oder Seitenlage und Krampfanfälle 1

3. Lage und Situation bis zu 60 Minuten nach der Geburt

- Sicheres Stehen und erster Euterkontakt 3
- Unsicheres Stehen, häufiges Liegen, Kopf jedoch angehoben 2
- Weiteres Verharren in Liegeposition 1
(Seitenlage, aufgestützter Kopf)

Punktzahl:	9-8 Punkte	vitales Fohlen	Gesamt: <input type="checkbox"/>
	7-6 Punkte	gefährdetes Fohlen	
	<6 Punkte	hochgradig gefährdetes Fohlen	

Gießener Vorsorgeschema II (6.-24. Std. p.n.)

1. Stehvermögen

- Vollständiges Stehvermögen und koordinierte Bewegung 3
- Stehvermögen unsicher, taumelnde, unkoordinierte Bewegung 2
- Häufiges Liegen, schwerfälliges Aufstehen, unkoordinierte Bewegung 1

2. Körpertemperatur

- 38,2 – 39,0°C 3
- > 39,2°C 2
- < 38,0°C 1

3. Darmpechabgang

- Normal bis 8 Stunden nach der Geburt, danach Milchkot 3
- Geringe Mengen, häufiges Pressen, zunehmende Unruhe 2
- Kein Kotabsatz beobachtet, häufiges Pressen, Unruhe, Liegen und Wälzen 1

4. Harnabsatz

- Normal im Strahl mehrfach nach der Geburt in genügender Menge 3
- Häufiger Harndrang mit Absatz kleiner Portionen oder in Tropfen 2
- Kein Harnabsatz, trotz häufiger Harnabsatzposition 1

5. Atmung

- Regelmäßig und gleichmäßig 3
- Unregelmäßig 2
- Stoßweise – flach, geblähte Nüstern 1

6. Kontakt mit Stute

- Regelmäßiger Kontakt mit Aufsuchen des Euters und Sauggeräusche 3
- Abstand zur Mutter erheblich, kaum oder abnehmender Euterkontakt 2
- Umherirren ohne Mutterkontakt, kein Aufsuchen des Euters 1

Punktzahl:	18 Punkte	normale Entwicklung	Gesamt: <input type="checkbox"/>
	17-15 Punkte	gefährdet, Tierarztkontrolle notwendig	
	<15 Punkte	hochgefährdet, sofortige Konsultation eines Tierarztes notwendig	